

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ANATOMIA DENTARIA

PSA 2022

DOCENTE: DRA. MARCELA EXENI

1.- LA ANATOMÍA DENTARIA ES UNA PARTE DE LA ANATOMÍA HUMANA, QUE ESTUDIA AL DIENTE, LOS TEJIDOS DE SOSTÉN Y LOS ELEMENTOS ANATÓMICOS CIRCUNDANTES.

a) Verdadero

b) Falso

2.-- LA ANATOMIA DENTARIA MANTIENE RELACION BIOLOGICA CON:

a) Fisiología

b) Histología

c) Embriología

d) Diametrología

3.- A CUANTOS GRADOS COMIENZA LA ACCION DE LA TEMPERATURA A MANIFESTARSE SOBRE EL DIENTE PRODUCIENDO GRIETAS EN EL ESMALTE.

a) 175°C

b) 400°C

c) 800° C

4.- LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD DEL INDIVIDUO SE PUEDE ESTABLECER A TRAVÉS DE LA CRONOLOGÍA DE:

a) Erupción dentaria clínica

b) Término de formación de la raíz

c) Término de formación del esmalte.

5.-LA ORTODONCIA ES LA QUE TRATA DE RESTABLECER LA ANATOMIA DENTARIA A TRAVES DE RESTAURACIONES DE PIEZAS CAREADAS:

a) Verdadero

b) Falso

6.,-LAS FUNCIONES MAS IMPORTANTES QUE CUMPLEN LOS DIENTES PERMANENTES SON:

a) Estética

b) fonética

c) Masticatoria

- d) Mantenimiento de espacio
- e) Estimular el crecimiento de los maxilares

7.- EL ESMALTE DEL DIENTE ES DE ORIGEN:

- a) Mesodérmico
- b) Ectodérmico
- c) Endodérmico

8.- LA DENTICION TEMPORARIA POR CUANTOS DIENTES ESTA CONFORMADO

- a) 20
- b) 22
- c) 10

9.- EN EL PISO DE LA BOCA SE ENCUENTRAN LAS GLANDULAS:

- a) submaxilares
- b) sub linguales
- c) parótidas
- d) tiroideas

10.- EL CEMENTO DEL DIENTE SE ENCUENTRA EN LA:

- a) Corona
- b) Raíz
- c) cuello

11. EL TEJIDO ADAMANTINO ES AQUEL TEJIDO QUE CUBRE LA DENTINA DE LA PORCION

- a) coronaria
- b) radicular
- c) pulpar

12.- EL TEJIDO MAS DURO DEL DIENTE ES:

- a) Cemento
- b) Dentina
- c) Esmalte

13.- LAS CELULAS FORMADORAS DE ESMATE SON:

- a) Osteoblastos

- b) Ameloblastos
- c) Cementoblastos
- d) Fibroblastos

14.-POR CUANTOS HUESOS ESTA CONFORMADO LA CARA:

- a) 14
- b) 12
- c) 16
- d) 15

15.- LOS DIENTES TEMPORARIOS TAMBIEN SE LOS CONOCE COMO DIENTES CADUCOS:

- a) Verdadero
- b) Falso

16.- LAS CARAS DE CONTACTO DE UN DIENTE SON:

- a) Vestibular
- b) Mesial
- c) Distal
- d) Palatino

17.- LOS MUSCULOS MASTICADORES SON:

- a) Temporal
- b) Masetero
- c) Pterigoideo interno y externo
- d) Milohioideo
- e) Digástrico

18.- LA CORONA DE LOS DIENTES POSTERIORES TIENEN UNA FORMA:

- a) Triangular
- b) Cuboidea
- c) Cuña

19.-QUE DIENTES TIENEN LA FUNCION DE DESGARRAR LOS ALIMENTOS FIBROSOS:

- a) Incisivos
- b) Caninos

c) Premolares

d) Molares

20.- LOS ARCOS DENTARIOS PERMANENTES TIENEN NA FORMA:

a) Parabólica

b) Semicircular

c) Ovoidea

21.- QUE DIENTES PERMANENTES NO REEMPLAZAN A NINGUN DIENTE TEMPORARIO:

a) Caninos

b) Molares

c) Premolares

22.-EL PROCESO ALVEOLAR O PARTE ALVEOLAR ESTA LIGADO ALA PRESENCIA Y DESARROLLO DE LOS DIENTES.

a) Verdadero

b) Falso

23.- LOS ALVEOLOS DE UN DIENTE A OTRO ESTAN SEPARADOS POR EL:

a) Tabique Inter alveolar

b) Tabique Extra alveolar

c) Tabique Intra alveolar

24.- AL ALVEOLO DE UNA PIEZA DENTARIA QUE PRESENTA UNA SOLA RAÍZ SE LO DENOMINA UNIRADICULAR.

a) Verdadero

b) Falso

25.-EL PROCESO ALVEOLAR DE LA SEGUNDA INFANCIA SE EXTIENDE DESDE:

a) Nacimiento hasta los 3 años

b) 3 hasta los 6 a 7 años

c) 6 o 7 años hasta los 12 a 13 años

26.- EN QUE PROCESO ALVEOLAR PRESENTAN DENTICION MIXTA (TEMPORARIA Y PERMANENTE).

a) Proceso alveolar de la Adolescencia.

b) Proceso alveolar de la primera infancia

c) Proceso alveolar de la segunda infancia

d) Proceso alveolar de la tercera infancia

27.- LA ARTICULACIÓN ALVEOLODENTARIA SE INCLUYE DENTRO DEL GRUPO GENÉRICO DE LAS:

a) Diartrosis

b) Sinartrosis

c) Anfiartrosis

28.- LA ARTICULACION ALVEOLO DENTARIO TAMBIEN ES CONOCIDO COMO GONFOSIS O JUNTURA CLAVAL?

a) Verdadero

b) Falso

29.- EL SENO MAXILAR O ANTRO DE HIGMORO SE ENCUENTRA EN EL

a) Maxilar superior

b) Maxilar inferior

30.- LA REDUCCIÓN DE NÚMEROS DE DIENTES EN EL HOMBRE SE DENOMINA OLIGODONCIA.

a) Falso

b) Verdadero

31.- AL LIGAMENTO PERIODONTAL TAMBIEN SE LO CONOCE CON EL NOMBRE DE MEMBRANA CIRCUNRADICULAR

a) Verdadero

b) Falso

32.-LAS FIBRAS PRINCIPALES DEL PERIODONTO SON:

a) Crestodentales

b) Oblicuas

c) Horizontales

d) Periapicales

e) Ordinarias

33.- LAS FIBRAS OBLICUAS RESISTEN A LAS FUERZAS DE:

a) Extrusión

b) Intrusión

c) Lateralidad

34.-LAS CELULAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR ABUNDANCIA EN EL PERIODONTO SON LOS:

a) Histiocitos

b) Linfocitos

c) Fibrocitos

35.- EL ESPESOR DEL PERIODONTO HA SIDO ESTIMADO EN TÉRMINO MEDIO EN:

a) 1 mm

b) 0,50 mm

c) 0,20 mm

36.- LAS PROLONGACIONES DEL CUERPO DEL MAXILAR SUPERIOR SON TRES, CUALES SON:

A) Apófisis frontal

b) Apófisis palatina

c) Apófisis alveolar

d) Apófisis cigomática

37.- SIGAUD DESCRIBE CUATRO TIPOS MORFOLÓGICOS QUE SON:

a) Muscular, Digestivo, Cerebral, Respiratorio

b) Ovalada, Triangular, Cuadrada y Trapezoidal

c) Sanguínea, Nerviosa, linfáticos y biliosa

38.- CUANTAS CARAS TIENE LA CORONA DE UN DIENTE ANTERIOR:

a) 5 Caras

b) 6 Caras

c) 4 Caras

39.- LA CARA VESTIBULAR DE LOS INCISIVOS CUAL ES LA FORMA MAS COMUN QUE TIENE:

a) Trapezoidal

b) Pentagonal

c) Cuadrada

40. LA CLASIFICACION DE WILLIAMS SE BASA EN LA CORRESPONDENCIA QUE EXISTE ENTRA LA FORMA DE LA CARA Y LA FORMA DE LA PORCION RADICULAR DE LA PIEZA.

a) Falso

b) Verdadero

41.- LA ANCHURA MÁXIMA DE UN DIENTE SE MIDE DESDE LAS PARTES MAS CONVEXAS DE LAS CARAS DE CONTACTO.

a) Verdadero

b) Falso

42. LA CARA VESTIBULAR DE LOS DIENTES POSTERIORES TAMBIEN SE LA CONOCE CON EL NOMBRE DE:

a) Cara Posterior

b) Cara Mesial

c) Cara Yugal

d) Cara Distal

43.- CUANDO DOS CÚSPIDES ESTÁN CONSTITUIDAS, SE UNEN AL NIVEL DE SUS BASES. Y NO HAY, INTERRUPCIÓN EN LA CONTINUIDAD ES UN:

a) Surco no fisurado

b) Surco Fisurado

44.- CUANDO DOS CÚSPIDES ESTÁN CONSTITUIDAS, Y NO SE UNEN NIVEL DE SUS BASES. Y HAY, INTERRUPCIÓN EN LA CONTINUIDAD ES UN:

a) Surco no fisurado

b) Surco Fisurado

45.- LOS PLIEGUES SON DEPRESIONES LISAS, SUPERFICIALES Y DE EXTENSIÓN VARIABLE.

a) Falso

b) Verdadero

46.- QUE FACETAS DE UNA CÚSPIDE SON MAS IRREGULARES Y ACCIDENTADAS.

a) Facetas Centrales

b) Facetas Periféricas

47.- LOS MOLARES SUPERIORES DE ACUERDO A SU NUMERO DE CUSPIDES SON:

a) Multicuspidios

b) Unicuspideos

c) Bicuspidios

48.-LOS DIENTES TEMPORARIOS INICIAN SU CALCIFICACIÓN DURANTE LA :

- a) Vida intrauterina
- b) Vida extrauterina

49.- LOS DIENTES TEMPORARIOS CUMPLEN FUNCIONES FISIOLÓGICAS QUE SON:

- a) Estética
- b) Fonética
- c) Masticatoria
- d) Mantener la dimensión vertical
- e) Acción estimulante en el crecimiento de los maxilares

50.- EL CAPUCHÓN DEL ESMALTE DE LOS DIENTES TEMPORARIOS SE ORIGINA DEL:

- a) Mesodermo
- b) Ectodermo
- c) Endodermo

51.- LOS DIENTES TEMPORARIOS TIENEN UNA COLORACIÓN

- a) Blanco amarillento
- b) Blanco azulado

52.- LOS DIENTES TEMPORARIOS CUMPLEN LA FUNCIÓN DE MANTENER EL ESPACIO PARA LA ERUPCIÓN DE DIENTES PERMANENTES.

- a) Falso
- b) Verdadero

53.- LA DENTICIÓN TEMPORARIA ESTÁ COMPUESTA DE TRES GRUPOS, DE DIENTES CUALES SON:

- a) Incisivos
- b) Caninos
- c) premolares
- d) Molares

54.- LOS DIENTES PERMANENTES EN RELACIÓN A LOS TEMPORARIOS, SON DE MENOR VOLUMEN Y TAMAÑO.

- a) Falso
- b) Verdadero

55.-LOS DIENTES TEMPORARIOS TIENE MAYOR SENSIBILIDAD QUE LOS PERMANENTES.

- a) Falso
- b) Verdadero

56.- NORMALMENTE EN LOS DIENTES TEMPORARIOS QUE DIENTE ES EL QUE ERUPCIONA PRIMERO.

- a) Incisivos
- b) Caninos
- c) Molares

57.- SEGÚN LA ERUPCIÓN DENTARIA QUE EDAD TENDRÍA ESTE PACIENTE?



- a) 5-6 años
- b) 7-8 años
- c) 8-9 años

58.- LA CAMARA PULPAR DE LOS DIENTES TEMPORARIOS ES MAS REDUCIDA QUE LA CAMARA PULPAR DE LOS DIENTES PERMANENTES.

- a) Verdadero
- b) Falso

59.- LOS DIENTES TEMPORARIOS SE MANTIENEN EN EL ARCO DENTARIO TEMPORAL DURANTE

- a) 42 meses
- b) 36 meses
- c) 20 meses

60.- LA PÉRDIDA DE LOS DIENTES TEMPORARIOS PROVOCAN EL AUMENTO DE LA DIMENSION VERTICAL

a) Verdadero

b) Falso

61.- LA FORMA GEOMÉTRICA DEL INCISIVO CENTRAL ES TRAPEZOIDAL

a) Falso

b) Verdadero

62.- EL BORDE INCISAL DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR ES:

a) Completamente horizontal.

b) Ligeramente ascendente de mesial a distal

c) Ninguna de las anteriores

63.- ES FRECUENTE ENCONTRAR AL INCISIVO LATERAL SUPERIOR EN FORMA DE:

a) Clavija

b) Redonda

c) Cuadrada

64.-EL INCISIVO LATERAL SUPERIOR ERUPCIONA:

a) 6 años

b) 8 años

c) 10 años

65.- LA CALCIFICACIÓN DE LA CORONA DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR INICIA A LOS 16 MESES

a) Falso

b) Verdadero

66.- EN QUE CARA DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR SE ENCUENTRA UNA INVAGINACIÓN LLAMADA FORAMEN CALCUM.

a) Cara Distal

b) Cara Vestibular

c) Cara Palatina

d) No se encuentra en el Incisivo Lateral Superior

67.- LA CARA VESTIBULAR DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR ES DE FORMA GEOMÉTRICA DE TRAPECIO ESCALENO

a) Falso

b) Verdadero

68.- LA LONGITUD DE LA CORONA DEL LATERAL SUPERIOR ES DE

- a) 7,8 mm
- b) 8,8 mm
- c) 9,8 mm

69.- EL CONTORNO DE LA CARA MESIAL DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR TIENE FORMA:

- a) Trapezoidal
- b) Triangular
- c) Ovoidea

70.- EL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTE ERUPCIONA A LOS 9 AÑOS

- a) Falso
- b) Verdadero

71 .- EL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTE OCLUYE CON EL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR Y EL INCISIVO LATERAL SUPERIOR

- a) Falso
- b) Verdadero

72.- LOS REBORDES O CRESTAS MARGINALES DE LA CARA LINGUAL DEL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTE PRESENTAN:

- a).- Relieve pronunciado
- b).-Poco o nulo relieve
- c).-Ninguna de las anteriores

73.- LA FORMA GEOMÉTRICA DEL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTE POR SU CAR VESTIBULAR ES DE UN TRAPPECIO ISÓSCELES

- a) Falso
- b) Verdadero

74.- EL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTE SU ERUPCIÓN ES LOS 8 AÑOS.

- a) Falso
- b) Verdadero

75.- EL BORDE VESTIBULAR DE LA CARA MESIAL DEL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTES SE PRESENTA CON UNA FUERTE INCLINACIÓN HACIA:

- a) Vestibular
- b) Lingual
- c) Central

76.- LAS CARAS MESIAL Y DISTAL DEL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTE TIENEN FORMA DE UN TRAPPECIO ALARGADO.

a) Falso

b) Verdadero

77.- EL INCISIVO LATERAL INFERIOR PERMANENTE ES DE MENOR TAMAÑO QUE EL INCISIVO CENTRAL INFERIOR PERMANENTE

a) Falso

b) Verdadero

78.- EL INCISIVO LATERAL INFERIOR PERMANENTE OCLUYE CON:

a) Con el 1/3 distal del incisivo central superior y la ½ mesial del lateral superior.

b) Con 3/4 partes de la cara palatina del Incisivo Lateral Superior

c) Con la porción vestibular del Incisivo Central Superior

79.- EL CINGULUM DE LA CARA LINGUAL DEL INCISIVO LATERAL INFERIOR RECIBE TAMBIEN EL NOMBRE DE

a) Cuarto lóbulo

b) Tercer Lóbulo

c) Segundo Lóbulo

71.- LOS CANINOS SON PIEZAS DENTARIAS QUE SE CARACTERIZAN POR SER:

a) Unicuspídeos

b) Bicuspídeos

c) Multicuspídeos

72.- EL BRAZO MESIAL DEL BORDE INCISAL DEL CANINO SUPERIOR EN RELACIÓN AL BRAZO DISTAL ES:

a) Largo y redondeado

b) Corto y menos inclinado

c) Largo y mas inclinado

73.- EL CANINO SUPERIOR PERMANENTE ERUPCIONA A LOS:

a) 9 a 10 años

b) 10 a 13 años

c) 8 a 9 años

74.- EL LARGO DE LA CORONA DEL CANINO SUPERIOR PERMANENTE ES DE 9,5MM.

a) Falso

b) Verdadero

75.- LA FORMA GEOMÉTRICA DEL CANINO SUPERIOR PERMANENTE POR SU CARA VESTIBULAR ES:

- a) Pentagonal
- b) Trapezoidal
- c) Triangular

76.- EL CANINO SUPERIOR PERMANENTE OCLUYE CON:

- a) La mitad distal del primero premolar inferior y la mitad mesial del segundo premolar inferior.
- b) La mitad distal del canino inferior y la mitad mesial del primer premolar inferior.
- c) La mitad mesial del canino inferior y la mitad distal del primer premolar inferior.

77.-LA RAÍZ DEL CANINO SUPERIOR ES TAN VOLUMINOSA QUE FORMA EN EL HUESO SALIENCIAS VESTIBULARES CONOCIDAS CON EL NOMBRE:

- a) Tubérculos Caninos
- b) Eminencias Radiculares
- c) Lóbulos Caninos
- d) Ninguna de las anteriores

78.- LA RAÍZ DEL CANINO SUPERIOR ES CONICA, DE GRAN DIMENSION, UNICA, VOLUMINOSA CUYO EJE SE INCLINA HACIA MESIA.

- a) Verdadero
- b) Falso

79.- EL CANINO INFERIOR PERMANENTE TERMINA SU CALCIFICACIÓN A LOS 18 AÑOS.

- a) Verdadero
- b) Falso

80.- EL CANINO INFERIOR PERMANENTE OCLUYE CON EL CANINO SUPERIOR Y PRIMER PREMOLAR SUPERIOR

- a) Verdadero
- b) Falso

81.- EL CANINO INFERIOR EN RELACION AL CANINO SUPERIOR ES:

- a) De mayor volumen
- b) De menor volumen
- c) De igual volumen

82.- EL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR OCLUYE CON:

- a) La mitad distal del canino inferior y la mitad mesial de primer premolar inferior

- b) La mitad distal del primer premolar inferior y mitad mesial del segundo premolar inferior
- c) La mitad mesial del canino inferior y la mitad distal del primero premolar inferior.

83.- EL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR PERMANENTE SU CALCIFICACIÓN INICIA A LOS 3 AÑOS Y ERUPCIONA DE 9 A 10 AÑOS

- a) Verdadero
- b) Falso

84.- LA CARA OCLUSAL DEL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR ES DE FORMA:

- a) Hexagonal.
- b) Pentagonal.
- c) Ovoidal

85.- LA CARA OCLUSAL DEL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR PRESENTA UN SURCO PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA MAS PROXIMO A

- a) Palatino
- b) Mesial
- c) Vestibular

86.-LA LONGITUD TOTAL DEL SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR ES 23MM

- a) Verdadero
- b) Falso

87.- EL SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR ES UNA PIEZA :

- a) Uniradicular
- b) Biradicular
- c) Multiradicular

88.- EL SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR PERMANENTE ERUPCIONA DE 10 A 11 AÑOS

- a) Verdadero
- b) Falso

89.-EL SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR OCLUYE CON

- a) La mitad distal del canino inferior y la cuarta mesial del primer premolar superior.
- b) La mitad distal del segundo premolar inferior y la cuarta parte mesial del primer molar inferior.
- c) La mitad distal del canino inferior y la mitad mesial del primer premolar inferior.

90.- LOS SURCOS SECUNDARIOS DE LA CARA OCLUSAL DEL SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR EMERGEN DE:

- a) Fositas secundarias mesial y distal
- b) Fositas secundarias vestibular y palatina
- c) Fositas secundarias mesial y vestibular

91.- LOS PREMOLARES INFERIORES PERMANENTES SON MENOS VOLUMINOSOS EN SENTIDO MESIO DISTAL QUE LOS PREMOLARES SUPERIORES

- a) Verdadero
- b) Falso

92.- EL PRIMER PREMOLAR EN SU CARA OCLUSAL PRESENTA DOS FOSITAS SECUNDARIAS DE DONDE EMERGEN LOS SURCOS:

- a) Mesiovestibular
- b) Mesiolingual
- c) Distovestibular
- d) Distolingual
- e) Mesiodistal

93.- EL PRIMER PREMOLAR INFERIOR OCLUYE CON LA MITAD DISTAL DEL CANINO Y LA MITAD MESIAL DEL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR

- a) Verdadero
- b) Falso

94.- EL PRIMER PREMOLAR INFERIOR PERMANENTE PRESENTA DOS RAÍCES APLANADAS Y OVOIDES

- a) Verdadero
- b) Falso

95. EL SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR PERMANENTE ERUPCIONA A LOS 13 AÑOS Y SU CALCIFICACIÓN INICIA A LOS 4 AÑOS Y TERMINA A LOS 14 AÑOS

- a) Verdadero
- b) Falso

96.- LOS MOLARES PRESENTAN UNA FORMA OVOIDE CON UNA SUPERFICIE TRITURANTE PARA LA EFICIENCIA MASTICATORIA.

- a) Verdadero
- b) Falso

97.- EL PRIMER MOLAR SUPERIOR PERMANENTE SU CALCIFICACIÓN INICIA A LAS 36 SEMANAS Y TERMINA A LOS 9 AÑOS

- a) Verdadero
- b) Falso

98.- EL, PRIMER MOLAR PERMANENTE OCLUYE CON LAS $\frac{3}{4}$ DISTALES DEL PRIMER MOLAR Y EL $\frac{1}{4}$ MESIAL DEL SEGUNDO MOLAR INFERIOR.

a) Verdadero

b) Falso

99.-EL PRIMER MOLAR PERMANENTE PRESENTA GENERALMENTE TRES RAÍCES SEPARADAS

a) Verdadero

b) Falso

100 EL PRIMER MOLAR INFERIOR PERMANENTE SU LONGITUD DE LA CORONA Y RAÍZ ES TOTAL ES DE 25MM

a) Verdadero

b) Falso